

KANGDONG SACRED HEART HOSPITAL



내몸사용설명서

뇌혈관 질환

Cerebrovascular diseases



강동성심병원

뇌혈관 질환

- 뇌혈관 협착, 기형 및 파열에 의해 발생하는 질환
- 암 다음으로 흔한 사망원인이며, 단일 질환으로는 가장 높은 사망률 기록

뇌경색(경동맥 및 뇌혈관 협착)



- **발병 후 4~6시간 내에** 혈관중재술을 통한 개통이 필요한 위급한 상황
- 증상 | 편측마비, 안면마비, 감각이상, 구음장애 등

뇌동맥류



- **뇌동맥의 혈관 벽 일부가 약해져** 풍선처럼 부풀다가 터져 뇌출혈(지주막하 출혈)을 일으키는 질환



- 출혈 시 약 50% 사망
- 증상 | 갑작스러운 심한 두통, 심한 구역질과 구토, 실신, 안검하수, 사물이 둘로 보이는 현상

모야모야병



- **특별한 이유 없이 뇌 속 특정 혈관이 막히는** 만성 진행성 뇌혈관 질환
- 증상 | 두통, 뇌출혈, 경련, 의식장애, 신경장애

뇌동정맥 기형



- **선천적인 뇌혈관 발달 이상으로 뇌의 일부 동맥과 정맥 사이에 모세혈관이 없는 기형적 상태의 질환**
- 증상 | 두통, 뇌출혈, 경련, 사지마비, 의식 저하

뇌혈관 질환 증상

증상이 갑자기 나타나는 것이 특징입니다.

- 갑자기 말이 둔해지고 팔다리에 마비 증상
- 격심한 두통
- 구토
- 의식장애

* 이러한 증상이 나타나면 즉시 병원에 내원하여 검사를 받으셔야 합니다.



뇌혈관 질환 예방법

- 채소, 과일 섭취
- 꾸준한 운동
- 짜지 않게 음식조절



과일과 채소



꾸준한 운동



짜지 않게 음식조절

뇌혈관 질환 발생 원인

1



가족력

2



고혈압

3



당뇨, 고지혈증

4



흡연

5



비만

6



스트레스



고위험 뇌혈관수술,
섬세한 뇌를 되살리다

신경외과 조병문 교수

뇌혈관외과(뇌동맥류), 신경손상(두부외상)

1mm 미세
뇌혈관을 집도하다

신경외과 이종영 교수

뇌혈관 하이브리드 중재술, 뇌졸중, 뇌혈관 협착,
경동맥 협착, 모야모야병, 뇌혈관 기형, 두통, 척추질환



섬세하게
뇌혈관을 집도하다

신경외과 전홍준 교수

뇌졸중, 뇌혈관 협착, 경동맥 협착, 모야모야병,
뇌혈관 기형, 두통, 뇌혈관 하이브리드 중재술



대표번호 1588-4100