

KANGDONG SACRED HEART HOSPITAL



내몸사용설명서

사시, 소아안과

Pediatric Ophthalmology & Strabismus



강동성심병원

사시란?

- 정면을 볼때 두 눈이 똑바로 보지 않고 어느 한쪽 눈이 다른 곳으로 향하는 것으로 눈의 정렬이 바르지 못한 상태
- 전체 사시환자 중 약 85%가 10대 이하의 소아

사시의 증상



한쪽 눈이 안쪽 또는 바깥쪽으로 향해 있거나 초점이 풀려 보인다.



햇빛에 나가면 한쪽 눈을 찡그린다.



눈의 피로 및 두통을
자주 호소한다.



물체를 주시할 때
머리를 한 쪽으로 돌리거나
기울인다.

사시의 종류



내사시



외사시



상사시



하사시

사시의 치료법



비수술적치료 :

안경교정, 약시 치료, 가림 치료,
프리즘 안경



수술적치료 :

영아 내사시는 만 2세 이전,
간헐외사시는 대개 만 10세
이전 수술

영유아 눈 건강 이상 신호



생후 3~4개월이
되어도 눈을 잘
맞추지 못한다.



눈동자의 위치가
이상하고 종종 한쪽
눈을 찡그린다.



눈을 자주 비비고
눈부심이 심하다.



멀리있는 물체를
볼 때 찌푸리며 본다.



눈물이 항상
고여있거나 눈곱이
자주 낀다.



고개를 돌리거나
한쪽으로 기울여서
본다.

우리아이 눈 건강,
전문가에게
맡기세요.

안과

최연주 교수

사시, 소아안과, 눈썹찢림,
안검하수, 눈물길질환

대표번호 1588-4100

